


Cómo Administrar tus Pastillas

DÍA 1

Tome Mifepristona



Trague la primera pastilla
(Mifepristona)

DÍA 2

Tome los Medicamentos Adicionales

El siguiente medicamento, Misoprostol, se toma 24 horas después de la Mifepristona.




30 a 60 minutos antes de tomar Misoprostol, tome 1 pastilla de ibuprofeno para el dolor y 1 pastilla de ondansetrón para náusea

DÍA 2-3


Tome Misoprostol

24 horas después de la primera pastilla, y después de tomar ibuprofeno y ondansetrón, tome 4 tabletas de Misoprostol.



Coloque 2 tabletas en cada mejilla debajo de las encías.

Misoprostol Adicional (si lo necesita)



Deje las 4 pastillas en su lugar para 30 minutos y luego trague los fragmentos de la pastilla.

SI EL MEDICO LO DIRIGE:
Repita el Misoprostol con 4 tabletas más, 4 horas después

DÍA 2-3

Continúa los Medicamentos Adicionales

Para dolor/calambres:

- Toma 800mg ibuprofeno cada 8 horas.
- Si necesitas controlar el dolor más, puedes tomar hasta 1000 mg de Tylenol (acetaminofén) entre dosis.



Para las náuseas:

- Tome 4 mg de Zofran (ondansetrón) cada 4 a 8 horas cuando sea necesario

DÍA 2-3 +

Que Puedes Esperar de Esto

Anticipe calambres y sangrado, incluyendo los coágulos; **esto significa que el embarazo está pasando**. Utilice toallas sanitarias para controlar el nivel de sangrado.

Las náuseas, la fiebre y los síntomas parecidos a los de la gripe pueden ser normales durante las 24 horas después de tomar misoprostol.


Sangrando como el período puede durar 2 semanas. Esté atento a los síntomas de complicaciones. →

Cuando Deberías Llamarnos

Demasiado Sangrando


Monitorea sus Toallas Sanitarias:

Utiliza toallas sanitarias en lugar de tampones para controlar el sangrado



Si remojas 2 toallas sanitarias en una hora, por 2 horas seguidas,

El sangrado y los calambres son normales, incluso los coágulos. La cantidad es diferente para cada paciente.



POR FAVOR LLÁMANOS

Infección

Fiebres:

Durante las 24 horas después de tomar Misoprostol, en el segundo día, puede ser normal tener fiebre o sentir resfriado.

Si tienes fiebre después de este tiempo,

POR FAVOR LLÁMANOS

Dolor Excesiva:

Si tiene dolor intenso y los medicamentos no ayudan

POR FAVOR LLÁMANOS



Regresando a la Clínica

Prueba de Embarazo

No es necesario regresar a la clínica para una cita en persona. Puedes hacerte una prueba de embarazo en casa después de 4 a 6 semanas. Si lo prefieres, puedes hacerte una ultrasonido después de 2 semanas para confirmar que no estás embarazada.

Si la prueba de embarazo es positiva a las 6 semanas, o si todavía se siente embarazada después del aborto,

POR FAVOR LLÁMANOS

Meadow Clinic tiene un médico disponible 24 horas, los 7 días de la semana. Si tiene preguntas o preocupaciones, llámenos a:

703-783-3300

Meadow
Reproductive Health & Wellness

Si en cualquier momento siente que es una emergencia, llame al 911